


Flare® GOLD G

Fungicida granulare, specifico per la lotta contro le Peronosporacee che colpiscono colture ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra, confere, latifoglie e tappeti erbosi.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
metaxil-m puro g 2,4
coformulanti q.b. a g 100



NOCCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A., Milano
Via Gallarate 139

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA -
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10378 dell'08.03.2000
Partita n.

Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyárfelep, Tulpán utca (Hungary)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Kg 5

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

METALAXIL-M: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esofalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

Compatibilità

Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

“Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli.”

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche

Flare GOLD G è un fungicida sistemico per la lotta contro malattie fungine dei generi Pythium e Fitofora, agenti di numerosi marciumi radicali e del colletto su diverse colture. Il prodotto si impiega sulle colture e contro le malattie di seguito elencate.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si usa incorporato al terreno secondo quanto segue:

Colture	Parassiti	Dosi	Epoca		Note	
			semina	pre-trapianto		
- FLORICOLE E ORNAMENTALI	Pythium Fitofora	2-4 g/mq		pre-trapianto	ripetere il trattamento dopo 25-30 giorni	
				pre-invasatura	incorporare al terreno	
- CONIFERE E LATIFOGLE	Fitofora	120-140 g/m ²	pre-impianto-vivajo	pre-impianto-vivajo	ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi	
					20-50 g/pianta	ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi
					50-150 g/pianta	ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi
					20-40 g/pianta	ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi
- TAPPETI ERBOSI	Pythium	15-30 kg/ha			ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi	

Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabile con una diminuzione d'efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.