



Prodotti libera vendita



ZEOLITE POLVERE

Ammendante minerale naturale a sostegno delle difese delle piante

CARATTERISTICHE

ZEOLITE POLVERE è un prodotto minerale derivante dal processo di fine macinazione delle rocce di zeoliti fino ad ottenere particelle molto piccole. Applicata sulle foglie crea una pellicola protettiva che rallenta l'attacco e la diffusione di patogeni fungini (botrite, peronospora, oidio, bolla del pesco), insetti e acari. Agisce anche con un effetto cicatrizzante sulle ferite d'entrata dei funghi. Ideale da utilizzare in ambienti umidi grazie alla sua azione disidratante ed essiccante: la parte esterna della pianta si asciuga più velocemente riducendo e prevenendo le probabilità di sviluppo delle ife fungine.

COMPOSIZIONE

Zeolite


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Il prodotto può essere utilizzato su tutte le colture alla dose di 600-700 g/hl nei trattamenti fogliari e alla dose di 6-8 kg/ha nei trattamenti polverulenti (a secco).

Per i trattamenti primaverili ed estivi, in caso di bisogno, si consiglia di usare il prodotto alla dose di 30-40 kg/ha.



SAPONE MOLLE CONCENTRATO

Corroborante – potenziatore delle difese delle piante

CARATTERISTICHE

SAPONE MOLLE CONCENTRATO è di origine vegetale, composto da sale di potassio di acidi grassi completamente biodegradabile. SAPONE MOLLE CONCENTRATO agisce per contatto e svolge anche un'ottima azione disgregante sugli insetti a corpo molle e sui residui organici. SAPONE MOLLE CONCENTRATO infatti pulisce la vegetazione e la frutta da ogni forma di imbrattamento naturale o parassitario come melate, fumaggini ecc. SAPONE MOLLE CONCENTRATO, impiegato in miscela con fungicidi, insetticidi e diserbanti svolge un'eccellente azione sinergica in quanto presenta un'attività adesivante e veicolante favorendo una completa copertura della vegetazione irrorata.

COMPOSIZIONE


Sapone molle 100%

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Il prodotto si usa su tutte le piante alla dose di 500-800 g/hl a seconda delle necessità. In condizioni particolarmente difficili ripetere il trattamento dopo 7-8 giorni o aumentare la dose fino a 1-1,3 kg/hl.



OLIO DI LINO

Corroborante – potenziatore delle difese delle piante



vebi

CARATTERISTICHE

OLIO DI LINO aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di cocciniglie. In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i dosaggi del 25-30% in quanto aumenta la dimensione media delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e aumenta la superficie di contatto. OLIO DI LINO è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

COMPOSIZIONE

Olio di lino 100 %

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.



PROPOLI

Corroborante – potenziatore delle difese delle piante



vebi

CARATTERISTICHE

Il prodotto trova impiego in agricoltura biologica come fitoprotettore e fitostimolante per diverse piante. Si caratterizza per diverse proprietà tra le quali un'azione protettiva nei confronti delle piante verso attacchi di funghi (oidio e altre muffe) e batteri. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi e/o potature. Stimola inoltre la radicazione, la fioritura, favorisce l'allegagione, migliora la produzione durante l'accrescimento e dona colore, sapore e conservabilità ai frutti. Infine, grazie alla sua profumazione, attira gli insetti impollinatori (api). E' applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la fioritura.

COMPOSIZIONE

Estratto di Propolis in soluzione acquosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni dall'inizio della fioritura fino a prima del raccolto dei frutti e dalla rottura delle gemme alla piena fioritura per le piante da fiore.

Azione protettiva: trattare in caso di bisogno e se occorre ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo intervento. Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore dal trattamento.



ORTICA

Sostanza di base di origine naturale, 100% vegetale



vebi

CARATTERISTICHE

L'ortica è una sostanza attiva presente in natura e nota per le sue proprietà insetticide e acaricide. Rende inospitale l'ambiente per afidi, acari, ragno rosso e carpocapsa. È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pero, susino, pesco, ciliegio, noce), da orto (patata, lattuga, cavolo, fagiolo, pisello, ravenello), vite e piante da fiore (rosa).

COMPOSIZIONE


Urtica dioica (CAS. n. 84012-40-8), estratto da ortica fresca o secca, parte aerea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Approvazione della sostanza di base secondo Regolamento di esecuzione UE n. 2017/419

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro d'acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 5-6 trattamenti per pianta. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.



Azione
curativa e
protettiva



EQUISETO

Sostanza di base di origine naturale, 100% vegetale



vebi

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di equisetto (*Equisetum arvense*), sostanza presente in natura nota per le sue proprietà fungicide. Agisce in difesa da peronospora, oidio, bolla del pesco, alternaria e septoria. È utilizzabile sugli alberi da frutto (melo, pesco), da orto (cetriolo, pomodoro) e vite.

COMPOSIZIONE


Equisetum arvense (EQUISETO – Coda cavallina), estratto da parte commestibile (fusto [stelo] sterile).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Approvazione della sostanza di base secondo Regolamento di esecuzione UE n. 2014/462

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro d'acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Non utilizzare con temperature troppo elevate. Può essere applicato anche nei periodi molto piovosi. Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 2-6 trattamenti per pianta. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.



Azione
curativa



FERTICUS 18 M

Polvere bagnabile - Concime fogliare a base di rame e manganese



CARATTERISTICHE

FERTICUS 18M è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi

Miscela di microelementi rame (da ossido e idrossido), manganese (da solfato)

Rame (Cu) totale18%

Manganese (Mn) solubile in acqua0,5%

COLTURE E DOSAGGIO

Vite: 3-4 kg/Ha; Pomacee: 1,5-2,5 kg/Ha; Drupacee: 1-2 kg/Ha; Olivo: 4-5 kg/Ha; Actinidia: 2-3 kg/Ha; Agrumi: 3-4 kg/Ha; Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 3-5 kg/Ha; Pomodoro, patata e altri ortaggi: 3-5 kg/Ha.

confezione			
	1 Kg		20 pezzi
	10 Kg	---	90 pezzi



FERTICUS 40 M

Polvere bagnabile - Concime fogliare a base di rame e manganese



CARATTERISTICHE

FERTICUS 40M è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi

Miscela di microelementi rame (da ossicloruro), manganese (da solfato)

Rame (Cu) totale40%

Manganese (Mn) solubile in acqua0,5%

COLTURE E DOSAGGIO

Vite: 1,5-3 kg/Ha; Pomacee: 1-2 kg/Ha; Drupacee: 0,5-3 kg/Ha; Olivo: 2-4 kg/Ha; Actinidia: 1-3 kg/Ha; Agrumi: 1,5-3 kg/Ha. Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 2-4 kg/Ha; Pomodoro, patata e altri ortaggi: 1,5-3 kg/Ha.

confezione			
	1 Kg		20 pezzi
	10 Kg	---	90 pezzi



FERTICUS 380

Sospensione concentrata
Concime fogliare con rame



CARATTERISTICHE

FERTICUS 380 è frutto dell'esperienza formulativa di Manica. Contiene 380 g/l di rame metallo sottoforma di ossicloruro, sale che garantisce una perfetta stabilità e miscibilità anche con altri prodotti.

È un prodotto altamente micronizzato con una dimensione omogenea delle particelle di rame (1 micron circa). La sua concentrazione garantisce un'estrema praticità per l'agricoltore professionista che può utilizzare il prodotto anche a basso volume: dai nostri test si è vista una possibilità di concentrare il prodotto fino a 5 volte (2%).

È il prodotto ideale anche per gli hobbysti in quanto è di facile dosaggio e può essere usato anche con le pompe a spalla (sprovviste di agitatore).

COMPOSIZIONE

Concime fogliare con rame

a base di microelementi

Rame (Cu) da ossicloruro 26% (380 g/l)

COLTURE E DOSAGGIO

Cereali, barbabietola.	2-3	lt/ha
Vite.	1,5-2,5	lt/ha
Olivo, Nocciolo, Agrumi	1-2	lt/ha
Ortaggi	2-4	lt/ha
Pomacee, Drupacee, Actinidia	1-3	lt/ha



confezione



1 lt (1,9 Kg)

10 pezzi

MANISOL

Polvere bagnabile per trattamenti fogliari
a base di rame, calce, ecc.



CARATTERISTICHE

Crea sulla superficie dei vegetali una PELLICOLA simile a quella del caolino, ma più intensa e con ELEVATA RESISTENZA AL DILAVAMENTO (dopo una pioggia non è necessario ripeterne l'applicazione). Questa pellicola protegge dai colpi di sole e dagli attacchi di insetti, in particolare la MOSCA DELL'OLIVO.

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 5%

DOSAGGIO

OLIVO: 3-4 Kg/HI



POMODORO: 1-3 Kg/HI



confezione



15 Kg



RAME 30

Concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%

CARATTERISTICHE

RAME 30% è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30% può essere impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 0,5%
Rame (Cu) totale 30%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
Materie prime: Borato di Sodio, Ossicloruro di Rame, Solfato di Magnesio solo di origine naturale.

DOSAGGIO

60 g per 10 litri d'acqua

colture	dosi
colture da frutto, olivo e vite	2,5-5 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
fragola e colture ortive	2-3 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
agrumi	3-4 kg/ha volume d'acqua 600-800 l
colture a pieno campo	3-4 kg/ha volume d'acqua 400-600 l

confezione



1 Kg



20 pezzi



vebi

CUTHIOL FOGLIA FERTILIZZANTE

Concime CE in pasta fluida a base di rame e zolfo

CARATTERISTICHE

Il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta fluida è stabile, conferisce alle sue particelle una finchezza colloidale ed una elevata adesività con ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge.
Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina; prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi effettuare una prova di compatibilità.

COMPOSIZIONE

Concime CE
Concime al rame in sospensione (ossicloruro) (S 14,8)
Rame (Cu) totale 20,3%
Zolfo (S) elementare 14,8%

DOSAGGIO

CUTHIOL Foglia va utilizzato per applicazioni fogliari:
COLTURE DA FRUTTO (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, olivo, agrumi, nocciolo, ecc.) E VITE: 400-600 gr per 100 litri d'acqua.
COLTURE ORTICOLE (patata, pomodoro, asparago, carciofo, cavolo, cavolfiore, cetriolo, cocomero, melone, zucchino, fragola, insalata, pisello, fagiolo, fagiolino, lenticchia, melanzana, sedano, finocchio, carota, aglio, cipolla ecc.): utilizzare 400-600 gr per 100 lt di acqua.
ROSA E FLORICOLE: 400-600 gr per 100 lt di acqua.
COLTURE DI PIENO CAMPO (barbabietola, cereali, tabacco ecc.): utilizzare 3-5 kg/ha diluiti in 1.000 litri di acqua.

confezione



0,75 Kg = 0,5 lt 24 pz



1,5 Kg = 1 lt 12 pz



THIOPLUS 80 WP POLVERE BAGNABILE

Fertilizzante in polvere micronizzata

CARATTERISTICHE

Zolfo idrosospensibile.

Correttivo, fitonutriente coadiuvante nella lotta contro l'oidio della vite e l'eriofide del nocciolo.

COMPOSIZIONE

Zolfo idrosospensibile CORRETTIVO

Zolfo (S) totale (esente da Selenio) 80%

DOSAGGIO

400-800 gr per 100 litri di acqua, secondo la sensibilità della pianta e il grado di infezione.



LIQUIZOL FOGLIA

Correttivo - Sospensione concentrata di Zolfo micronizzato in acqua

CARATTERISTICHE

Il Liquizol Foglia è un correttivo in pasta fluida a base di Zolfo elementare; il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta fluida è stabile, conferisce alle particelle una finezza colloidale ed una elevata adesività con ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge.


COMPOSIZIONE

Zolfo (S) elementare 50%

DOSAGGIO

Le dosi di impiego devono essere adattate in funzione della coltura, dello stadio della coltura e delle condizioni climatiche.

Liquizol Foglia è compatibile con la maggior parte dei prodotti in commercio, in ogni caso si consiglia di eseguire una prova preliminare.



ZOLFO VENTILATO FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare

CARATTERISTICHE

Spiccata efficacia preventiva e curativa contro l'Oidio della vite, delle pomacee, delle drupacee, del mandorlo, del nocciolo, degli ortaggi e delle colture floreali.

COMPOSIZIONE

Materie prime: zolfo elementare, ossicloruro di rame.
Zolfo puro (esente da Selenio) gr. 95
Inerti (Solfato di calcio) q.b. a gr. 100

DOSAGGIO

Kg. 25-40 per ettaro.

Mannino S.P.A.
zolfi ventilati



ZOLFO VENTILATO RAM S FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare con Rame (Cu)

CARATTERISTICHE

Zolfo ramato 5% è un prodotto con proprietà fungicide, antioidiche e antiperonosporiche della vite, delle pomacee, delle drupacee, del mandorlo, del nocciolo, degli ortaggi, delle colture floreali a duplice attività a base di zolfo ventilato associato a rame sotto forma di ossicloruro. La miscela permette di trattare simultaneamente l'oidio e la peronospora, realizzando una notevole economia di manodopera.

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da Selenio) gr. 97
Rame Metallo (sotto forma di ossicloruro) gr. 0,75
Coformulanti q.b. a gr. 100

DOSAGGIO

Kg. 20-25 per ettaro.

Mannino S.P.A.
zolfi ventilati



confezione



5 Kg



25 Kg



confezione



5 Kg



25 Kg

FOSFITO

Concime fogliare a base di Fosfito di Potassio.

CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT FOSFITO è un concime fogliare liquido contenente Fosforo, Potassio e microelementi ed è indicato per il trattamento di diverse colture. L'alta presenza di questi elementi nutritivi nel prodotto svolge un'azione di convogliamento verso gli organi di riserva (frutti, semi, radici), degli amidi e delle sostanze zuccherine, con conseguente miglioramento delle caratteristiche organolettiche e commerciali del prodotto (colore, sapore, profumo, consistenza e resistenza ai trasporti). Il Fosforo, oltre ad apportare nutrimento alla coltura, nella sua particolare forma chimica induce la pianta a produrre una maggiore quantità di sostanze naturali di difesa (fitoalessine) rendendola più resistente agli squilibri nutritivi indotti da stress da freddo, siccità, super produzione, agenti patogeni etc.

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua 30%
 Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua 20%
 Boro (B) solubile in acqua 0,01%
 Rame (Cu) solubile in acqua 0,02%
 Rame (Cu) chelato con EDTA 0,02%
 Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02%
 Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%
 Manganese (Mn) solubile in acqua 0,01%
 Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%
 Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,001%
 Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01%
 Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

DOSAGGIO

Agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura:

- per via fogliare: 200-300 ml/hl;
- per via radicale: 6-18 litri/hl.

Orticoltura:

- per via fogliare: 50-200 ml/hl;
- per via radicale: 6 litri/hl.

confezione



1 Kg

12 pezzi

potenzia le
difese
naturali della
pianta



vebi

PANESCA

Esca lumachicida in micropellet per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

PANESCA è un'esca in micropellet lumachicida con supporto proteico dal forte potere adesante verso lumache, limacce e chioccioline. Agisce per contatto e ingestione. PANESCA si presenta sotto forma di esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all'azione della pioggia e del vento. Grazie alla sua formulazione è di facile impiego.

COMPOSIZIONE

Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3) 5 g
 Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g
 Contiene Denatonio benzoato (amaricante)

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10878 del 11/04/01

PFnPO

in
micropellet
di $\varnothing$ 2 mm per
un'ampia
resa



confezione



250 g



24 pezzi



36
cartoni



1 kg

12 pezzi

40
cartoni



vebi

SANEEM

Concime completo universale a base di Neem

CARATTERISTICHE

SANEEM è un concime completo e naturale per ortaggi, frutta e giardini; si caratterizza dalla massiccia presenza di pannelli di NEEM. Il Neem è un frutto oleario di un grande albero asiatico. Ha un notevole effetto naturale contro gli insetti ed i parassiti del terreno. SANEEM consente piante sane e robuste e raccolti abbondanti e saporosi.

- NPK 4-5-12
- CONCIME COMPLETO ORGANO-MINERALE
- AZIONE NATURALE CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale4%
di cui Azoto (N) Organico4%
Anidride fosforica (P₂O₅) Totale5%
solubile in acidi minerali
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua12%
Carbonio (C) organico di origine biologica16%

IL PANNELLO DI NEEM È QUELLO CHE RIMANE DAL FRUTTO DEL NEEM DOPO L'ESTRAZIONE DELL'OLIO, DA CUI SI RICAVA IL NOTO INSETTICIDA BIOLOGICO SISTEMICO AZADIRACTINA.

DOSAGGIO

A TERRA: gr 100-200 per mq, in base alle esigenze nutrizionali della coltura (ortaggi, piante da frutta, ornamentali).
SU VASO E FIORIERA: gr 5-10 per lt di contenuto del vaso, secondo la sensibilità della pianta e la grandezza del vaso stesso.

confezione			
	20 Kg	---	1200 Kg
	4 Kg	40 pezzi (palbox)	133 pezzi
	1 Kg	12 pezzi	---



VitaVerde
PER LE TUE NATURALI PASSIONI

Nutry Hobby
Concimi Natura e Qualità

NEEMOIL

Olio di Neem. concime liquido universale

CARATTERISTICHE

È nota l'azione del Neem contro la maggior parte degli insetti. L'olio di Neem, irrorato sulla pianta o dato in fertirrigazione, viene assorbito facilmente, distribuendosi su tutta la pianta (azione sistemica) ed è adatto per tutte le colture (ortaggi, frutta e giardini).

- AZIONE NATURALE CONTRO GLI INSETTI
- USO FOGLIARE E RADICALE
- AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE

Melia Azadirachta seed oil*
Polysorbate 85
* da agricoltura biologica

IL NEEMOIL È ESTRATTO DAL FRUTTO DELL'ALBERO DI NEEM (MELIA AZADIRACHTA, DI ORIGINE ASIATICA) PER SPREMITURA MECCANICA A FREDDO, ED È UN PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE. DALL'OLIO DI NEEM SI RICAVA IL NOTO INSETTICIDA BIOLOGICO SISTEMICO AZADIRACTINA.

DOSAGGIO

PER IRRORAZIONE FOGLIARE: 100-140 ml per 10 litri d'acqua.
IN FERTIRRIGAZIONE: 250 ml per 100 mq di terreno coltivato, diluito nell'acqua di irrigazione.

confezione	
	250 ml
	12 pezzi



VitaVerde
PER LE TUE NATURALI PASSIONI

Nutry Hobby
Concimi Natura e Qualità

MAVRIK® CASA GIARDINO

Insetticida a largo spettro per ornamentali.



CARATTERISTICHE

Agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, possiede un'ottima efficacia iniziale e una buona persistenza d'azione. Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino. Agisce sugli insetti per contatto, contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.

INSETTI

Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici, Larve minatrici, Infanzia, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri, Ragnetti.

COMPOSIZIONE


per 100 g
Tau-Fluvalinate puro 21,4 g (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a. 100 g

DOSAGGIO

4-10 ml per 10 l

REGISTRAZIONE

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11997 del 06.05.2004



POLYSECT® ULTRA SL

Insetticida sistemico in concentrato liquido per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE

Concentrato emulsionabile ad ampio spettro d'azione.

COMPOSIZIONE

per 100 gr di prodotto:
Acetamiprid puro 0,5 g (= 5 g/l)
Coformulanti ed attrattivi q.b. a. 100 g

DOSAGGIO

Diluire 10 ml di prodotti un 1 litro d'acqua.

REGISTRAZIONE

Ministero della Salute, Reg. 14970/PPO

POLYSECT® ULTRA AL

Insetticida sistemico pronto all'uso per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE

Pronto all'uso

COMPOSIZIONE

per 100 gr di prodotto:
Acetamiprid puro 0,005 g (= 0,05 g/l)
Coformulanti ed attrattivi q.b. a. 100 g

DOSAGGIO

- Alberi e arbusti ornamentali: 1000 ml/L. Trattamento contro cocciniglie, afidi, acari, parassiti vari.
- Rose: 1000 ml/m². Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie.
- Colture floreali diverse: 1000 ml/10 m². Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie, cicadellidi e parassiti diversi.

REGISTRAZIONE

Reg. n. 16243 del 07/09/2015

confezione		
	800 ml	12 pezzi
	100 ml	12 pezzi



VIGORSANA

Soluzione nutritiva NP

CARATTERISTICHE

VIGORSANA è una soluzione nutritiva NP per applicazione fogliare con proprietà tensioattive che permettono il dilavamento degli essudati organici depositati sulle foglie e relativo parassita. Utilizzabile sia in serra che in pieno campo. Utilizzato in miscela con i fitofarmaci ne migliora l'efficacia grazie al suo pH acido: pH (sol. 100%) = $\pm 0,5$.

- CONCIME CHE NUTRE E PULISCE
- DETERGE ESSUDATI E PARASSITA

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale10%
di cui Azoto (N) Nitrico1,5%
Azoto (N) Ureico8,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua8%

DOSAGGIO

Per l'eliminazione di essudati organici, su olivi ed agrumi, utilizzando elevati volumi d'acqua: 500-1000 ml/100 L (5-10 ml/lt).

In miscela con altri trattamenti convenzionali, su pero, melo, pomacee ornamentali o piante da fiore e piante sensibili: 250-500 ml/100 L (2,5-5 ml/lt).



confezione



1 lt

12 pezzi

OLEOSAN PLUS

Insetticida polivalente pronto uso per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

OLEOSAN PLUS è un insetticida polivalente a base di Olio minerale e Cipermetrina. Efficace contro un largo spettro di parassiti che infestano le piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico.

COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.)
(CAS n. 97862-82-3)gr 0,80 (= 8,0 gr/l)
Cipermetrinagr 0,005 (0,05 gr/l)
Coformulanti q.b. agr 100

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 15135 del 22/02/2011



vebi



PFnPO

confezione



1 litro

12 pezzi



24 cartoni

CIP

Insetticida acaricida a largo spettro d'azione per il controllo dei parassiti su piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

CIP è un insetticida pronto all'uso non sistemico, contenente Cipermetrina. Il prodotto permette di controllare un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole e ornamentali. CIP agisce per contatto e ingestione.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) gr 0,0053
Coformulanti q.b. a gr 100

MODO D'USO

Spruzzare CIP su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40–50 cm circa, preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.

DOSAGGIO

Parassiti: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha pronubana*) e Bega del garofano (*Epichoristodes acerbella*): 1 l per 10 mq.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 14724/PPO del 23/10/2009



vebi

IKEBANA TRIPLE ACTION

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all'uso per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

IKEBANA TRIPLE ACTION è un prodotto ad attività insetticida, acaricida e fungicida pronto all'uso per la protezione di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico. IKEBANA TRIPLE ACTION controlla efficacemente insetti, acari e le principali malattie fungine: Afidi, larve di lepidotteri Plusia, Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio e Ruggini.

COMPOSIZIONE

Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) 0,0015 g
Deltametrina pura (N. CAS 52918-63-5) 0,0010 g
Tebuconazolo puro (N. CAS 107534-96-3) . . 0,0200 g
Coformulanti q.b. a 100 g

DOSAGGIO

Parassiti: Afidi, Larve di lepidotteri plusia, Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio, Ruggini: 1 l per 10 mq.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 12735/PPO del 01/08/2016



vebi

Doppia
azione: per
contatto e
ingestione

PfFnPO

confezione



500 ml



24 pezzi



32
cartoni



confezione



750 ml



12 pezzi

PfFnPO



BASTINSECT

Insetticida in bastoncini pronto all'uso

CARATTERISTICHE

Bastoncini insetticidi pronti all'uso per proteggere e nutrire le piante floreali e ornamentali. La sua doppia azione di insetticida sistemico e nutrimento completo lo rende il prodotto ideale per trattamenti preventivi fatti ad inizio stagione. Applicato al terreno o al substrato per idroponica il bastoncino si scioglie e rilascia nutrienti e insetticida per i successivi 3 mesi, proteggendo anche la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Parassiti controllati: Afidi, psille, mosca bianca, tisanotteri, cicaline, cocciniglie

COMPOSIZIONE

Acetamiprid 4%
Coformulanti NPK (MgO) 10-6-7- (2)

DOSAGGIO

Vasi: 1-2 bastoncini/ L terriccio – Idrocoltura: 0.5-1 bastoncino/L substrato. N. massimo trattamenti: 3 volte l'anno.

REGISTRAZIONE

Ministero della Salute, n. reg. 16508/PPO



COMPO DUAXO

Fungicida sistemico per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

COMPO DUAXO PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali quali: Oidio, Ruggine, Alternaria, Black spot, Ticchiolatura, Monilia. Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle persistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 21 giorni.

COMPOSIZIONE

per 100 gr
Difeconazolo purogr 1,80 (= 16,7 gr/lt)
Coformulanti q.b. agr 100

DOSAGGIO


2,5-10 ml per 1 litro d'acqua

REGISTRAZIONE

Reg. n. 13684/PPO Ministero della Salute del 22/06/2012



PFnPO



ROUNDUP® RAPIDO RTU

Erbicida liquido pronto uso ad azione sistemica, non selettivo e non residuale, per piante ornamentali e giardino domestico.

CARATTERISTICHE

Soluzione ideale per eliminare le infestanti in aree ricreative, giardini, cortili, vialetti pedonali, aree pavimentate o per distruggere vecchi prati da riseminare. Agisce rapidamente per traslocazione dalla foglia alle radici devitalizzando completamente la pianta. Si disattiva a contatto con il terreno. In caso di eliminazione del vecchio tappeto erboso lavorazione e semina sono possibili già dopo una settimana dal trattamento.

- AZIONE RAPIDA
- ELIMINA FOGLIE E RADICI
- NON LASCIA RESIDUI
- AD AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro g 0,72 = 7,1 g/l
sotto forma di sale isopropilamminico g 0,96 = 9,6 g/l
Acido Pelargonico g 2,00 (g/l 20,4)

INFESTANTI CONTROLLATE

Lo spettro d'azione è molto ampio e contempla le più diffuse specie mono e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perennanti.

DOSAGGIO


25-50 ml/mq. Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e erbustive.

REGISTRAZIONE

Aut. Min della Salute N.14885/PPO del 19/11/2012



PFnPO



DISERBANTE DICOTILEDONI

Diserbante per infestanti a foglia larga per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è un diserbante non residuale specifico per le malerbe a foglia larga. Per questo non danneggia le colture perenni arbustive ed arboree e, dopo 2-3 settimane, è possibile riseminare o trapiantare nuove piante dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso le foglie.

COMPOSIZIONE

2,4D acido puro 9,7 gr (= 100 gr/l)
Coformulanti q.b. a 100 gr

CAMPI DI IMPIEGO

DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (Stoppione, Plantago, Tarassaco, Margherite, Romice, Villucchio, Senape, Coda di cavallo, Edera, Vitalba, etc.) che infestano i prati e su tappeti erbosi di graminacee (Loietto, Festuca, Gramigna, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni. È necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare.

DOSAGGIO

Dicotiledoni a foglia larga:

- Trattamenti localizzati 50 ml in 1 l d'acqua o puro con specifici irroratori.
- Trattamenti generalizzati: 6-8 ml per 10 m² (= 6-8 l/ha).

REGISTRAZIONE


Reg. Min. della Salute N. 15677/PPO del 11/02/2013



vebi



PFnPO



COLLANTE

Concime azotato in soluzione.

CARATTERISTICHE


Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare, migliora l'assimilazione dei trattamenti utilizzati creando una maggiore adesività sulla foglia. Il prodotto è miscelabile con altri formulati (si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 15%
di cui Azoto (N) ureico 15%

DOSAGGIO

50 ml/hl



[illegible][illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

